

Koninginnepage

Grote vlinder, 75 mm. Hier nog zeldzaam maar wordt door het hele land heen wel gezien. Trekvlinder. Sterk wisselende aantallen



Waardplanten: schermbloemigen zoals wortel, venkel en dille, bevernel. Engelwortel, pastinaak, maggi, ruitachtigen



Voedselbron volwassen vlinder: nectarrijke bloemen, verbena bonariensis, lavendel, duifkruid, echte koekoeksbloem, kattenstaart

Distelvlinder

De distelvlinder is een trekvlinder, die vanuit zuid Europa en het Atlasgebergte in noord Afrika hierheen komt vliegen met gunstige wind, vanaf mei te zien. Ze planten zich hier voort en vliegen in de herfst terug.
45-60 mm.



Waardplanten: distels (akkerdistel), grote brandnetel, bernagie, akkerdistel, gewone klit, soms kaasjeskruid en aster.



Voedselbron volwassen vlinder: nectarrijke bloemen als vlinderstruik, gewone klit

Boomblauwtje

14 mm. Standvlinder, overwintert hier. Symbiose met mieren omdat ze een zoete stof afscheiden, en beschermen de rupsen. Vanaf april te zien.



Waardplanten klimop, hulst, grote kattenstaart, struikhei, vlinderstruik
sporkehout, wegedoorn, klimop, grote kattenstaart, struikhei, hulst, vlinderstruik
en rode kornoelje.



Voedselbron volwassen vlinder: honingdauw, sap van bomen en honingdauw

Gehakkelde aurelia

Overwinteraars. 20-26 mm, de rups is wat groter lijkt op vogelpoepje.



Waardplanten: hop, brandnetel, hazelaar, ribes



Voedselbron volwassen vlinder: vlinderstruik, koninginnekruid, Grote brandnetel, hop, iep, aalbes

Oranje zandoogje

Een Standvlinder die voorkomt in twee gescheiden gebieden; het noordoosten van het land, bij ons in Drenthe en delen van aanliggende provincies en in het zuiden van het land. In het overige deel van het land wordt het oranje zandoogje nauwelijks waargenomen.

Vanaf eind juni vliegen de vlinders. De dichtheid op de vliegplaatsen is hoog, ca 44 tot 280 exemplaren per hectare. Geregeld zonnen de vlinders met gespreide vleugels op bladeren van bomen, struiken of kruiden. Als een oranje zandoogje te dicht wordt benaderd, schuift hij de voorvleugels omhoog, zodat de dubbelgekernde oogvlek zichtbaar wordt. Een ongenode gast kan hierdoor worden afgeschrikt.

Mannetjes houden vooral 's middags patrouillevluchten, doorgaans laag boven de vegetatie. Ze verdedigen geen territorium en benaderen alles wat op een soortgenote lijkt, zelfs bruine afgevalen blaadjes. Het mannetje blijft vaak enkele dagen in hetzelfde kleine gebied heen en weer vliegen. Vindt hij daar geen vrouwtje dan zoekt hij een andere plek, gemiddeld zo'n 150 meter verder.



Waardplanten: grassoorten, waaronder kroppaar, rood zwenkgras, gewoon struisgras, grote vossenstaart en kweek.



Voedselplanten: Jacobs kruiskruid, koninginnenkruid, struikhei en braam.

Keizersmantel

eind augustus-begin juli. De soort overwintert als pas uitgekomen rups op de schors tussen mossen; in het voorjaar beginnen de rupsen met eten. De eieren worden



Waardplanten: bosviooltjes, overwintert op de schors van een boom die vlak bij een groep viooltjes bos en maartse viooltjes die op een zon beschenen plaats groeien



Voedselbron volwassen vlinder: koninginnekruid, distels

Klein Koolwitje



Komt veel voor, vliegt vanaf maart



Waardplanten: koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad en Oost-Indische kers.



Het vaakst wordt het klein koolwitje voedsel zoekend waargenomen op kool (dus ook als nectarplant), vlinderstruik, akkerdistel en grote kattenstaart

Klein geaderd Witje



Waardplanten: kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem



De vlinders van de eerste generatie voeden zich met nectar van onder andere de waardplanten, later in het seizoen ook met dat van andere kruiden zoals akkerdistel en kale jonker

Oranjetipje

Half april-eind mei in één generatie. Het vrouwtje besteedt veel tijd aan het drinken van nectar; het mannetje wordt vaak patrouillerend waargenomen. Het vrouwtje legt 1 eitje per plant!



mannetje



vrouwtje



Waardplanten: Look-zonder-look, pinksterbloem, damastbloem en judaspenning.

Dit zijn ook de voedselplanten

Citroenvlinder

Verpopt in juni en overwintert als vlinder en na de winter vindt de paring plaats. Soms verplaatsen ze zich in de winter om een andere schuilplek te zoeken.



Ze zijn voor voeding dus afhankelijk van vroegbloeiende soorten als bijvoorbeeld de wilg. Het mannetje is echt geel, het vrouwtje bijna wit.



Waardplanten: Vuilboom en wegedoorn

Kleine Vuurvliinder

Rups: half augustus-half mei en eind mei-begin juli. De rups is meestal te vinden op de onderkant van een blad. Omdat een dun laagje van de onderkant van het blad wordt weggevreten zijn bezette bladeren vaak goed herkenbaar door doorvallend licht..



Waardplanten: Schapenzuring, veldzuring

Alleseter!! Honderden verschillende bloemen

Icarusblauwtje

Soms 3 verschillende generaties per jaar. Vrouwtje is bruin, mannetje blauw.



Waardplanten én voedselplanten: diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver

Atalanta

De atalanta is een trekvlinder, ze komen hier vanuit Zuid-Europa en trekken in november weer terug, soms in groepen. Groot deel van de rupsen en vlinders haalt de winter niet.



Waardplanten: grote en kleine brandnetel



Voedsel: koninginnenkruid, klimop, distels en vlinderstruik. Vooral in het najaar komen ze ook af op rottend fruit en sap van bloedende bomen.

Dagpauwoog

Van juli tot september. Overwintert hier, daarna in mei ook nog te zien.



Waardplanten: grote brandnetel



Kleine Vos

Ze overwinteren als vlinder in een holle boom, schuur of huis. Vanaf maart komen ze tevoorschijn en gaan ze op zoek naar voedsel. De rupsen zitten in groepen bij elkaar, soms wel 100 en spinnen samen een groot nest!



Waardplanten: grote brandnetel



De kleine vos drinkt de nectar uit de bloemen van de hemelsleutel of vlinderstruik. Soms met een hele groep bij elkaar!

Groot Koolwitje

2, soms 3 generaties per jaar. Eitjes worden gelegd in een dicht nest aan de onderkant geplaatst. Liefs bij gecultiveerde koolsoorten



Waardplanten: koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, Oost-Indische kers



distels, koninginnekruid, grote kattenstaart, paardenbloemen en andere gele composieten.

Landkaartje

2 generaties per jaar. In het voorjaar lichter en anders gekleurd dan in de zomer.



voorjaar



zomer



Waardplanten: grote brandnetel (genieten dat linker plaatje)



Voedsel: voorjaar fluitenkruid in de zomer zuigen ze nectar uit onder andere akkerdistel, berenklauw en koninginnenkruid